

Helixor

HELIXOR A - 1 mq, 5 mq, 20 mq, 50 mq, 100 mq inyeksiya üçün məhlul

Təsiredici maddə: ağ şam üzərində yaşayan ağ öksəotu (*Viscum album*) (bitki-ekstrakt nisbəti 1:20)

Köməkçi maddələr: inyeksiya üçün su, NaCl, natrium hidroksid

HELIXOR M - 1 mq, 5 mq, 20 mq, 50 mq, 100 mq inyeksiya üçün məhlul

Təsiredici maddə: alma ağacı üzərində yaşayan ağ öksəotu (*Viscum album*) (bitki-ekstrakt nisbəti 1:20)

Köməkçi maddələr: inyeksiya üçün su, NaCl, natrium hidroksid

FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ: İmmunomodulyasiyaedici və DNT-stabilləşdirici xüsusiyyətləri vardır. Yüksək in vitro dozalı Helixor-un yüngül dərəcədə orta dərəcəyədək sitotoksik effekt göstərdiyi məlumdur.

designed by freepik.com

GÖSTƏRİŞLƏR:

- osteoartrit
- osteoxondroz
- deformatsiyaedici spondilyoz
- miogeloz
- mialgiya
- revmatoid artrit
- virus Hepatitləri A, B, C
- xroniki-iltihabi xəstəliklər (qastrit, sistit, haymorit, tonsillit, sistit, bronxit, adneksit, metrit...)
- prekanserolar
- bədxassəli və xoşxassəli şişlər
- onkoloji cərrahi əməliyyatlardan sonra yaranan residivlərin profilaktikası



M

A



Helixor[®]A Helixor[®]M

İSTİFADƏ QAYDASI:

Digər təyinat yoxdursa, standart prosedura: həftədə 3 dəfə 1 inyeksiya. Adətən, müalicə 1 mq başlanğıc dozadan başlayır, dəstəkləyici terapiyanın optimal dozası əldə olunana qədər tədricən artırılır.

ƏKS-GÖSTƏRİŞLƏR:

- ağ öksəotuna qarşı həssaslıq (allergiya)
- kəskin iltihabi proses və ya hərərətli xəstəlik
- kəskin mərhələdə olan və ya immunosupressantlarla müalicə olunan autoimmün xəstəlik
- taxikardiya ilə gedən hipertireoz

Helixor preparatının hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi zamanı ehtiyatlı olmaq tövsiyə olunur.

YAN TƏSİRLƏRİ (AYRILIQDA VƏ YA BİRGƏ BAŞ VERƏ BİLƏR):

- bədən temperaturunun yüngül artması
- inyeksiya yerində məhdud iltihabi reaksiya
- regional limfa düyünlərinin müvəqqəti şişkinliyi

Yuxarıda sadalanan bu hallar təhlükəsizdir. 38°C-dən yuxarı temperatur (yorğunluq, titrəmə, ümumi xəstəlik əlamətləri, baş ağrıları və qısamüddətli başgicəllənmə ilə yanaşı) və ya inyeksiya yerində 5 sm-dən böyük reaksiya növbəti 3 gündən artıq davam edərsə, həkimə müraciət etmək lazımdır.

Əzələdaxili istifadəsi qadağandır!

Buraxılış forması: 1 ml-lik ampul - 5, 10, 20, 50 mq
2 ml-lik ampul - 100 mq

Azərbaycanda eksklüziv distribyutor "PLANETA" İKŞ

Tel: Baş ofis: (012) 430 89 49

E-mail: info@planeta.az

Aptek: (012) 430 30 10

www.planeta.az

Planeta.aptek