

# Sanuvis®

dezintoksikasiyaedici,  
toxumada turşuluğu  
aranan qaldıran,  
enerji mübadiləsini  
aktivləşdirən preparat.

## TƏSİRİDİÇİ MADDƏ:

Acidum L(+)-Lacticum  
D4/D6/D12/D30/D2000



## TƏRKİB:

Ampul - 2 ml

### durulaşdırılmış məhlulda:

0,4 ml Acidum L(+)-Lacticum D4-ün su məhlulu  
0,4 ml Acidum L(+)-Lacticum D6-nin su məhlulu  
0,4 ml Acidum L(+)-Lacticum D12-nin su məhlulu  
0,4 ml Acidum L(+)-Lacticum D200-ün su məhlulu

### Damcı - 100 ml

### durulaşdırılmış məhlulda:

20 ml Acidum L(+)-Lacticum D4 dil.məhlulu  
20 ml Acidum L(+)-Lacticum D6 dil.məhlulu  
20 ml Acidum L(+)-Lacticum D12 dil.məhlulu  
20 ml Acidum L(+)-Lacticum D30 dil.məhlulu  
20 ml Acidum L(+)-Lacticum D200 dil.məhlulu

## TƏSİR MEXANİZMİ VƏ FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Xroniki xəstəliklər zamanı müşahidə olunan hüceyrə hipoksiyası zamanı solahərlənən süd turşusunun əmələgəlmə prosesi artır ki, bu da bufer sistemlərinin işini pozur; pH tədricən turşuluğa doğru dəyişir. Süd turşusu asanlıqla və sürətlə konsentrasiya qradientinə görə hüceyrə membranından keçib toxumalarda toplanır, turşulaşma və intoksikasiya baş verir. Patologiya nəticəsində qüsurlu dövran yaranır: nə qədər az oksigen olarsa, bir o qədər çox süd turşusu yaranır, süd turşusu artdıqca toxumalar daha az oksigen mənimşəyir. Oksigen kifayət qədər olduqda süd turşusu əzələlərdə toplanır və limon turşusu tsiklinde  $\text{CO}_2$  və  $\text{H}_2\text{O}$  qədər tam oksidləşir və ATP əmələ gəlir. Sağahərlənən süd turşusu - Acidum L(+)-Lacticum oksidləşmə-bərpa proseslərini və hüceyrə regenerasiyasını aktivləşdirir, mitoxondrilərdə hüceyrə tənəffüsünü artırır, öz izomerini - solahərlənən süd turşusunun artığını neytrallaşdırır və orqanizmdən xaric edir. Bütün bunlar birləşdirici toxumadan şlakların təmizlənməsinə səbəb olur.



Dərman preparatlarının istehsalı:  
Sanum-Kehlbeck, GmbH & Co. Germany

Tel.: (+994 12) 430 89 49

[www.btk.az](http://www.btk.az)

[www.facebook.com/bioloji.tababat](http://www.facebook.com/bioloji.tababat)

# Sanuvis®

## GÖSTƏRİŞLƏR:

- Turşu-qələvi tarazlığının və aralıq maddələr mübadiləsinin pozulması
- Əməliyyatdan əvvəl və əməliyyatdan sonrakı terapiyada toxumaların drenajı
- Şəkərli diabetin ağrılaşmalarının kompleks müalicəsində (davamlı hiperqlikemiya, polineyropatiya, laktatasidemik koma və s.)
- MBT-nin və qaraciyərin xroniki iltihabı və degenerativ xəstəliklərinin kompleks terapiyasında
- Bütün növ maddələr mübadiləsi pozulmaları
- Ensefalopatiya
- Artlıq çəki, sellülit
- Mezoterapiya (hiperpigmentasiya, saç tökülməsi – bu zaman dəri turqorunun bərpası, qırışların hamarlanması, mikrosirkulyasiyanın yaxşılaşdırılması)



## İSTİFADƏ QAYDASI:

### Damcı:

**0 – 8 yaş** - hər yaşa 5 damcı,

**8 yaşdan yuxarı** gündə 3 dəfə x 60 damcı (1 ç/q) yeməkdən 30 dəq. əvvəl, yaxud 1 saat sonra az miqdar su ilə.

### Ampul-2 ml

**2 yaşa qədər** - ¼ ampul,

**2-6 yaş** - ½ ampul,

**6 yaşdan yuxarı** - 1 ampul həftədə 1-3 dəfə ə/d, v/d, d/l, d/a

**Əks göstəriş və  
əlavə təsirləri:**  
məlum deyil

### Buraxılış forması:

Flakon - 100 ml,  
Ampul - 2ml №10