



ALBICANSAN

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ
ВЕЩЕСТВО:
Candida albicans

ФОРМА ВЫПУСКА:
капли – флакон D5 10 мл;
свечи D3 №10;
Мазь D3 в 30 г тубика;

- Не токсичен
- Применяется с "0" лет
- Восстанавливает биоценоз слизистых



Изопатическое лечение микозов



Показания

- хронические микозы, в т.ч. молочница, грибковые поражения кожи, полости рта (стоматиты, гингивиты, афты и др.), микозы мочеполового тракта (вагиниты, вульвиты, вульвовагиниты, крауэроз вульвы, уретриты, аднекситы, эндометриты, сальпингиты),
- аллергические заболевания, бронхиальная астма, межпальцевая экзема рук или ног, болезни ЖКТ (холециститы, спастические колиты, стойкие запоры, панкреатиты, анальные трещины и др.),
- дерматозы и дисбактериозы во время или после антибиотикотерапии.
- микозах и кожных заболеваниях с грибковым наслоением
- баланитах, генитальном зуде

СОСТАВ:

1 мл **капель** содержит 1 мл раствора *Candida albicans* D5

1 г **мази** содержит: 0,1 г *Candida albicans* D3 по прописи 5аНАВ (прочие составные компоненты: 0,38г спиртовая мазь шерстяного воска, 0,10 г триглицеридов средней длины цепи, 0,03 г глицеролмоностеарат 40-50%, 0,23 г пропиленгликоля, 0,02 г сульфата магния, 7H₂O, 0,01 г молочной кислоты, 0,13 г воды для инъекций.)

1 г **свеча** содержит 0,2 г *Candida albicans* D3, 1,8 г твердого жира

СВОЙСТВА:

усиление клеточной иммунной защиты путем стимуляции популяции Т- лимфоцитов. Изопатическое действие основано на комбинации сaproфитной дрожжевой фазы с паразитарной грибковой фазой ***Candida albicans***.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

в первые 3 недели беременности препарат не рекомендуется применять, последующие сроки беременности, кормление, а также детский возраст не являются противопоказанием к применению препарата. У детей доза подбирается в соответствии с возрастом. Пропиленгликоль может вызывать кожные раздражения. Спиртовая мазь шерстяного воска может вызывать местные ограниченные кожные раздражения (н-р контактный дерматит)

Указание: *Candida albicans* в качестве действующего вещества содержится также в Exmykehl.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Капли для приема внутрь по 5-10 капель 1-2 раза в день за 30 мин до еды или через 1 час после под язык; для втирации: по 5-10 капель 2 раза в неделю в локтевой сгиб, исключительно на неповрежденную поверхность; для закапывания в нос: по 1-2 капли в каждую ноздрю 1-2 раз в день.

Детям: капли- до 1 года – 1 каплю растворить в ¼ стакана воды 1 раз в день; с 2-х до 8 лет – по 1 капле на год жизни 1-2 раза в день. Начинать с наружного применения (втирации в локтевой сгиб или вокруг пупка) – несколько дней, затем переходить на сублингвальный или комбинированный прием (часть препарата втирать, часть – сублингвально).

Мазь: 1-3 раза в день наносить тонким слоем на пораженный участок кожи.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

не известны

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

не применять при повышенной чувствительности к дрожжевым грибкам (***Candida albicans***).